



DISTRETTO SANITARIO 67

Via Vannielli, n. 74 - 84085 MERCATO S. SEVERINO (SA)

Tel. 089.823401/387 Fax 089.825165

Oggetto : PEDICULOSI

A TUTTI I GENITORI

Al fine di prevenire una eventuale diffusione dei casi di Pediculosi , si trasmette il seguente schema sintetico con indicazioni sulle modalità di comportamento in caso di questa infestazione.

GENERALITA'

- I pidocchi sono parassiti che si nutrono solo di sangue umano.
- Il contagio avviene per trasmissione diretta , oppure per scambio di pettini, cappelli, sciarpe .
- I pidocchi non volano, non saltano e si muovono con difficoltà.
- I pidocchi del capo non trasmettono malattie infettive.
- I pidocchi non infestano gli animali domestici.
- La disinfestazione dei locali è aleatoria , in quanto , lontano dal cuoio capelluto, questo parassita sopravvive per pochi giorni.

PREVENZIONE

Non esistono prodotti che prevengono l' infestazione di pidocchi;

L'ispezione periodica ed accurata dei capelli dei propri figli è utile per evidenziare precocemente il problema, notando i parassiti o le lendini adese tenacemente ai capelli.

Imparare a riconoscere la normale forfora, che cade facilmente, dalle lendini (le uova dei pidocchi) attaccate al capello con una

sostanza adesiva tenace, che si scioglie con aceto bianco tiepido ,
usando, poi, un pettine a denti molto stretti.

Raccomandare ai figli di non scambiarsi scarpe o cappelli e di
evitare di ammassare i cappotti.

INFESTAZIONE IN ATTO

- Restrizione della frequenza scolastica fino a 24 ore dopo idoneo
trattamento, certificato dal proprio Pediatra di Libera Scelta, che
permette la riammissione a scuola.
- L' applicazione di prodotto specifico , consigliato dal Pediatra, e
ripetuto dopo 10 giorni, per un mese, risolve facilmente il
problema.
- Disinfettare le lenzuola , gli abiti e i pupazzi di pezza : lavarli in
acqua calda oppure a secco (soprattutto i cappelli); oppure
lasciarli all'aria aperta per 48 ore.
- Lavare accuratamente pettini e spazzole, con acqua calda per 10
minuti e/o con shampoo per pediculosi.

Si rammenta , infine, che una pediculosi non è indice di cattiva
igiene personale, in quanto il pidocchio predilige capelli puliti.

Cordiali saluti .



Il Dirigente Medico-U.O.P.C.

Dott. Emilio Greco.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Greco".

Mercato S. Severino, 02/02/2010.

Misure di profilassi per esigenze di sanità pubblica
 PEDICULOSI - FTIRIASI ICD-9 132 - 132.9
 Classe di notifica: IV

Periodo di incubazione	Periodo di contagiosità	Provvedimenti nei confronti del malato	Provvedimenti nei confronti di conviventi e di contatti
<p>In condizioni cui- tuali per il ciclo vitale dei pidocchi, da 6 a 10 giorni in caso di infestazione con uova.</p>	<p>Fintanto che uova, forme larvali o adulte sono presenti e vitali sulle persone infestate o su indumenti ed altri fomites.</p>	<p>In caso di infestazione da <i>P. humanus corporis</i> isolamento da contatto per non meno di 24 ore dall'inizio di un adeguato trattamento disinfestante. Il trattamento disinfestante consiste nell'applicazione di polvere di talco contenente DDT al 10% oppure Malathion all'1% oppure permetrina allo 0,5% o altri insetticidi.</p> <p>Gli indumenti vanno trattati con gli stessi composti applicati sulle superfici intere oppure lavati con acqua bollente.</p> <p>In caso di infestazioni da <i>P. humanus capitis</i>, restrizione della frequenza di collettività fino all'avvio di idoneo trattamento disinfestante, certificato dal medico curante.</p> <p>Il trattamento disinfestante, consistente in applicazione di shampoo medicati contenenti permetrina all'1% o piretrino associato a piperonil-butoossido, e benzilbenzoato o altri insetticidi, deve essere periodicamente ripetuto ogni 7-10 giorni per almeno un mese.</p> <p>Pettini e spazzole vanno immersi in acqua calda per 10 minuti e/o lavati con shampoo antiparassitario.</p> <p>In caso di infestazioni da <i>Phthirus pubis</i> le zone interessate vanno rasate; i trattamenti disinfestanti sono simili a quelli da adottare per il <i>P. humanus capitis</i> e, se non sufficienti, vanno ripetuti dopo 4-7 giorni di intervallo.</p>	<p>Sorveglianza sanitaria per l'identificazione di altri casi di parassitosi, e conseguente trattamento disinfestante.</p> <p>I compagni di letto ed i partners sessuali di soggetti infestati da <i>P. pubis</i> devono essere trattati in via profilattica con gli stessi prodotti impiegati per i casi di infestazione conclamata.</p>

